

はじめに

病院機能評価について

目次

一般名・商品五十音順

商品五十音順

11 中枢神経系用薬	【ア】	商品五十音順	【イ】
112 催眠鎮静剤 新	一般名 商品五十音順	商品五十音順	
1124 ベンゾジアゼピ	【ア】	商品五十音順	【イ】
1125 バルビツール塩	アクトリット錠		
1129 その他の催眠剤	(オクソリド 100mg) アセトアミノフェン生剤		【イ】
114 解熱鎮痛消炎薬	(アリビニ生剤500) (ネオセチナーリ生剤100)		PL製剤
1141 アニリン系製剤	アロプリノーラ錠		【ア】
1149 その他の解熱剤	(アノプロリン錠)		アーチスト錠 10mg
116 抗パーキンソン	イオヘキソールキット		アデカット7、5mg錠
1164 しほど/他剤	(オムニーク300シリンジ) イコサペント酸エチルカルパ		アノプロリン錠
117 精神神経用剤	(エバゲール600)		アポプロン錠 0.1%
1172 フェノチアジン	【ロ】		アモバルボン錠 7、5
1179 その他の精神薬	増量エピナスチン錠		アリナミンF 25注
118 総合感冒剤	(アレジオン錠20)		アルデシンAGネーザル
1180 総合感冒剤	(アレジオン錠20)		アリビニ生剤50
12 末梢神経系用薬	増量エピナスチンシロップ用		アレグラ錠 60mg
121 局所麻酔剤	(アレジオンドライシロップ) 増量エピナスチンドライシロ		アレジオン錠 20
1214 キシリジン系薬	(アレジオンドライシロップ) 増量オルプリン注注射液		アレジオン錠 20
	(コアテック35mg)		アレジオンドライシロップ1%
	増量オキニッププロカイン液		アレジオンドライシロップ1%
	(ベノキニール点眼薬0.4%)		アンベック生剤20mg
	増量デラプリル錠		【イ】
	(アデカット7、5mg錠)		インター川点鼻液
	増量デモカプリル錠		【ロ】
	(エースコール錠4mg)		エースコール錠4mg
			エースコール錠4mg
			エバゲール600
			【イ】
			オクソリド 100mg
			オノンカプセル
			オムニーク300シリンジ

病院機能評価の認定を受ける為の一つとして、院内医薬品集の作成と定期的な改訂・増補されることが盛り込まれています。

将来的には、調剤薬局の機能評価においても必要になる可能性があります。

JAPIC PIA の特長

もっと簡単に
もっと自在に そしてもっと効率的に！

主な特長

- 医薬品集、採用薬一覧をWordで作成
- 目次(薬効別)、索引(商品順・一般名順)の自動作成
(適応症などのキーワード指定による逆引き索引)
- 最新の添付文書をダウンロード
- 院内LAN上での採用薬添付文書情報の閲覧(Webページ)
- Excel、CSVデータへの出力
- 同一成分薬の院外薬一覧の作成(同種同効薬(類似薬)表示)
- 医薬品集配布後に改訂分、追加分の冊子作成
- YJ、JANコード、GTINコードから採用薬データ作成
- 添付文書情報以外の独自情報の追加編集
- 後発品(ジェネリック医薬品)の管理
- 持参薬から同一成分医薬品の検索 (Webページ)
- 簡易医薬品集の作成



医薬品集、院内採用薬一覧をWordで作成

① Wordへ直接医薬品集を作成

簡単操作で作成できます。

1 神経系及び感覚器用医薬品

11 中枢神経系用薬

112 催眠鎮静剤 抗不安剤

1124 ベンジアゼピン系薬剤

■ノクスタール錠0.25mg(アルフレッサファーマ)【内用】

用法用量

本剤の用量は、年齢、症状、疾患などを考慮して適宜増減するが、一般に成人には次のように投与する。

(1)不眠症:1回プロプラナムとして0.25mgを就寝前1回投与する。

(2)麻酔前投薬:
手術前夜:1回プロプラナムとして0.25mgを就寝前1回投与する。
麻酔前:1回プロプラナムとして0.5mgを投与する。

効能効果

不眠症、麻酔前投薬

1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系薬剤

■フェノバルビツール【エビス】(エビス薬錠)【内用】

用法用量

フェノバルビツールとして、通常成人1日30~200mgを1~4回に分けて経口投与する。

不眠症の場合は、フェノバルビツールとして、通常成人1回30~200mgを就寝前1回投与する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。

効能効果

不眠症、不安緊張状態の鎮静、てんかんの発作発作強固抑制作用(全般性発作、大発作) 焦点発作(ジャクソン型発作を含む) 自覚的発作、精神運動発作

114 解熱鎮痛薬剤

1141 アニリン系薬剤

■フェナセチン【エビス】(エビス薬錠)【内用】

用法用量

効能又は効果	用法及び用量
頭痛、歯痛、歯科治療後の疼痛、耳痛、症候性神経痛、腰痛症、筋肉痛、打撲痛、捻挫痛、月経痛、関節痛	通常、成人にはフェナセチンとして、1回0.3~0.5g、1日1gを経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。
下記疾患の解熱、鎮痛 急性上気道炎(急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む)	通常、成人にはフェナセチンとして、1回0.3~0.5gを頓用する。なお、年齢、症状により適宜増減する。ただし、原則として1日6回までとし、1日最大1.5gを限度とする。また、空腹痛の投与は避けさせることが望ましい。

劇

劇向

- 1 -

医薬品集の作成 ウィザード

Word 2002

医薬品集の名前をフルパスで指定して下さい。

とりあえず、My Documentに医薬品集+日時で保管する

参照

1.『医薬品集の名前を指定』

これから作成する医薬品集に名前を付けて、保管場所を指定して下さい。

[次へ]ボタンをクリックする事で、自動的にMicrosoft Wordより指定した名前の文書が作成されます。

前回までの作成履歴(過去10回)

C:\Documents and Settings\Yokumura\My Document

前回の履歴を消去する

次へ キャンセル 医薬品集の作成

成』

ボタンをクリックして下さい

文書より、Wordにて医薬品集

成されますので、医薬品集の作成後、Wordにてページ設定や書式設定より、医薬品集文書を直接変更して下さい。

とりあえず先頭20件で試してみる

キャンセル 医薬品集の作成

医薬品集、院内採用薬一覧をWordで作成

② レイアウトなど多彩な条件を設定

医薬品集本文、目次、索引は、それぞれレイアウトの設定を変更できます。

医薬品集 レイアウトの設定

閉じる 保存 キャンセル

順に、医薬品集のレイアウト設定を行って下さい。
設定は何度でも後から変更可能となります。

医薬品集 | 掲載項目の設定 | **フォントの設定** | 項目の飾り | 属性行の設定 | 項目の制御 | 全体の制御 | 表

(イメージ)

それぞれのフォントを設定して下さい

217 血管拡張剤

■アラダートL錠10mg

高婦小 劇生○

【組成】

1錠中
ニフェジピン10mg
添加物: ポリソルベート80

薬効分類行

商品行

属性行


項目名

内容


- ・掲載項目の選択
用法用量、効能効果、禁忌、副作用、組成、相互作用...
- ・段組み(1段、2段)
- ・文字フォントの指定
- ・文字サイズの指定
- ・文字色の指定
- ・商品行のスタイル
- ・項目名の飾り
- ・並び順
薬効分類-五十音別
内注外-薬効分類-五十音別
薬効分類-内注外-五十音別

医薬品集、院内採用薬一覧をWordで作成

Word だから、後からいろいろ加工できます。





用紙方向を縦から横へ変更



2段を3段に

2段を1段に



文書を直接修正したり、画像を挿入したり、通常のWordの操作が可能です。

※画面の例は全てWord上での操作結果です。

目次(薬効別)、索引(商品順・一般名順)の自動作成

① Piaで作成した医薬品集より、さらに目次と索引を作成可能です。
 医薬品集をWord上で直接編集してページがズレても、問題ありません。

薬効分類別目次


目次	
11	中枢神経系用薬
112	催眠鎮静剤 抗不安剤
1124	ベンゾジアゼピン系製剤
1125	バルビツール酸系及びチオバル
1129	その他の催眠鎮静剤 抗不安
114	解熱鎮痛消炎剤
1141	アニン系製剤
1149	その他の解熱鎮痛消炎剤
116	抗パーキンソン剤
1164	レボドパミン製剤
117	精神神経用剤
1172	フェノチアジン系製剤
1179	その他の精神神経用剤
118	総合感冒剤
1180	総合感冒剤
12	末梢神経系用薬
121	局所麻酔剤
1214	キシリジン系製剤

商品順索引

商品五十音順	
【P】	アーチスト錠 10mg
P.L.開錠	アデカット7、5mg錠
【ア】	アノプロリン錠
	アボブロン錠0.1%
	アモバシ錠7、5
	アモバシ錠7、5
	アリナミンF 255注
	アルデシンA Qネーザル
	アルピニー坐剤50
	アレグラ錠60mg
	アレジオン錠20
	アレジオン錠20
	アレジオンドライシロップ1%
	アレジオンドライシロップ1%
	アンベック坐剤20mg
【イ】	イオン点眼液
【エ】	エースコール錠4mg
	エースコール錠4mg
	エパデールS 600
【オ】	


一般名順索引

一般名・商品五十音順			
【ア】	アクトリット錠	...	2 (内)
	アクトリット錠	...	2 (内)
	アセトアミノフェン坐剤	...	2 (内)
	アセトアミノフェン坐剤	...	2 (内)
	アロプリノーラ錠	...	10 (内)
	アロプリノーラ錠	...	10 (内)
【イ】	イオヘキソールキット	...	16 (内)
	イオヘキソールキット	...	16 (内)
	イコザセント能エチルカプセル(2)	...	10 (内)
	イコザセント能エチルカプセル(2)	...	10 (内)
【ロ】	増酸エピナスチン錠	...	11 (内)
	増酸エピナスチン錠	...	11 (内)
	増酸エピナスチンシロップ用	...	11 (内)
	増酸エピナスチンシロップ用	...	11 (内)
	増酸エピナスチンドライシロップ	...	11 (内)
	増酸エピナスチンドライシロップ	...	11 (内)
	増酸オキシプロカイン錠	...	7 (内)
	増酸オキシプロカイン錠	...	7 (内)
	増酸チラプリル錠	...	7 (内)
	増酸チラプリル錠	...	7 (内)
	増酸リドカイン注射液	...	5 (内)
	増酸リドカイン注射液	...	5 (内)
	増酸カブプリル細粒	...	8 (内)
	増酸カブプリル細粒	...	8 (内)
	増酸カルベジローラ錠	...	8 (内)
	増酸カルベジローラ錠	...	8 (内)
	増酸グルタラル	...	16 (内)
	増酸グルタラル	...	16 (内)
	増酸シプロフロキサシン注射液	...	14 (内)
	増酸シプロフロキサシン注射液	...	14 (内)
	増酸シメジウム注射液	...	5 (内)
	増酸シメジウム注射液	...	5 (内)
	増酸セファリンナトリウムキット	...	10 (内)
	増酸セファリンナトリウムキット	...	10 (内)
	増酸ソビクロン錠	...	1 (内)
	増酸ソビクロン錠	...	1 (内)



目次(薬効別)、索引(商品順・一般名順)の自動作成

② 適応症などのキーワード指定による逆引き索引



主な適応症の索引	
【アレルギー性鼻炎】	.. 5
.. 5	【脳神経炎】
.. 6	.. 8
.. 11	.. 9
.. 12	【脳神経炎】
【てんかんの痙攣発作】	.. 5
.. 1	.. 6
【パーキンソン症候群】	.. 5
.. 4	.. 6
【バルトリン膜炎】	.. 7
.. 14	.. 8
【胃・十二指腸潰瘍】	.. 9
.. 3	.. 10
.. 5	【骨髄炎】
【外傷】	.. 14
.. 3	【自律神経発作】
.. 14	.. 1
.. 15	【歯髄炎】
【角膜炎】	.. 5
.. 5	【焦点発作】
.. 6	.. 1
.. 14	【上肢神経炎】


キーワードを設定



例えば、重大な「適応症」などを、キーワードとして予め登録しておくことで、適応症(キーワード)の掲載されているページがひと目でわかる、逆引き索引ができます。

最新の添付文書をダウンロード

頻繁に変更される添付文書情報を、インターネット或いは電話回線を利用して、院内採用品の改訂情報、新規採用品の添付文書情報をダウンロードできます。



ダウンロード開始ボタンをクリックして戴くだけで、JAPIC PIAが自動的にサーバーに接続して、お客様の添付文書データをダウンロードします。
ダウンロード後、改訂レポートにより、どの薬品のどの項目が改訂されたかをご報告します。



ダウンロードの前にアップロードが必要となります。

改訂レポートは、改訂内容のどの部分が改訂されたか迄は、わかりません。

||| JAPIC |||

院内LAN上での採用薬添付文書情報の閲覧

院内の採用薬データを、Html形式で作成できます。
これにより、院内LAN上で添付文書情報の閲覧が可能となります。

医薬品集Webページ作成 ウィザード (2/4)

1. タイトルやお問合せ先などを短めに数行記載して下さい。

◇◇院内採用薬一覧◇◇
※タイトルは、全角で13文字程度

2006.12.11 更新
薬剤科
お問合せ 内(223) 山田まで

2. Webページ(Html)を一次的に保存するフォルダを参照ボタンより選択して下さい。

C:\temp\finepia

※LAN上の共用フォルダを直接指定して駄目事も可能です。
※指定されたフォルダは、一旦全てのファイルが削除され、空の状態になります。

薬効分類の代わりに院内独自分類を表示する。
 会社名は、製造元のみ表示する。

ページの背景色 白色 薄黄色 薄緑色 薄空色

次へ キャンセル

* ウィザード形式で簡単に作成
できます。

* 掲載する項目を選択できます。
警告、禁忌、効能効果、用法用量、
相互作用、副作用...

* 薬局からのお知らせがあれば、
その内容を記載できます。


日付の指定により、
・最近 改訂された品目
・最近追加した品目
の一覧も作成できます。



専用サーバーや検索用のデータベースシステムも必要ありません！
JAPIC PIAで作成したHtmlファイルを既存サーバーや共用フォルダへ転
送するだけです。

院内LAN上での採用薬添付文書情報の閲覧

共用フォルダや院内Webサーバーにアップロードしていただくことで、院内LANで閲覧できます。




医薬品情報データベース
iyakuSearch

日本医薬情報センター
iyakuSearch添付文書閲覧サービスと直リンク!!




専用サーバーや専用データベースは一切使用しません。
その代わりに、毎月差し替えが必要となります。

JAPIC



Excel、CSV データへの出力

院内採用薬データを指定の条件と指定の項目で抽出し、ExcelワークシートやCSVデータへ出力できますので、院内資料等にご活用いただけます。



The screenshot shows a Microsoft Excel window titled 'Microsoft Excel - 添付文書.xls'. The spreadsheet contains a table with the following data:

	C	D	E	F	
1			◆◆添付文書データ◆◆		
2					
3	YJコード	商品名	規格単位	会社名	効能効果
4	1112700X1038	フロセソ	1mL	武田薬品工業	効能効果 全身麻酔
5	1115401A1029	ネブタール注射液	5%10mLバイアル	大日本住友製薬	効能・効果 麻酔前投薬, 全身麻酔 不安緊張状態の鎮静, けいれん状態の抑制 獣医療領域における全 効能効果
6	1115403D1024	チトゾール0.3g	300mg1管(溶解液付)	杏林製薬	全身麻酔, 全身麻酔の 麻酔, 局所麻酔剤中毒
7	1115403D2020	0.5gインゾール	500mg1管(溶解液付)	日本医薬品工業	効能・効果 全身麻酔, 全身麻酔の 麻酔, 局所麻酔剤中毒
	1115403D2039	チトゾール0.5g	500mg1管(溶解液付)	杏林製薬	効能効果 全身麻酔, 全身麻酔の

* 医薬品集作成時と同等の抽出条件が指定できます。

* 出力する項目を選択できます。

商品名、規格単位、一般名、
効能効果、用法用量、警告、
禁忌、相互作用、副作用、
厚生労働省コード等

同一成分薬の院外薬(+同種同効薬)一覧の作成

Piaでは、院内採用薬と同一成分の院外薬一覧や、その他の各種資料を作成できます。医薬品集の別紙資料としてご活用できます。

(別紙) 同一成分院外薬一覧 【五十音順】

一般名	院内採用薬 採用品同種同効薬(類似薬) 院外薬	薬価
アクタリット錠	モーバー錠100mg 100mg 1錠 (田辺三菱製薬)	85.70
	<1149 その他の解熱鎮痛消炎剤> 採用品同種同効薬(類似薬)	
	ニキゾン錠60mg 1錠 (第一三共)	22.90
	ミナルフェン錠200 200mg 1錠 (ユーシービージャパン)	17.90
	ミナルフェン錠200 200mg 1錠 (ユーシービージャパン)	17.90
	ノイトロピン錠4単位4単位1錠 (日本臓器製薬)	36.20
	ソレトン錠80 80mg 1錠 (日本ケミファ)	23.80
	フルカムカプセル2.7mg 2.7mg 1カプセル(ファイザー)	77.20
	フルカムカプセル2.7mg 2.7mg 1カプセル(ファイザー)	77.20
	ジソペイン錠75 75mg 1錠 (田辺三菱製薬)	27.70
	ペルタゾン錠25 25mg 1錠 (あすか製薬)	43.10
	モービック錠10mg 10mg 1錠 (日本ベーリンガーインゲルハイム)	75.90
	ロルカム錠4mg 4mg 1錠 (大正製薬)	25.80
	セレコックス錠100mg 100mg 1錠 (アステラス製薬)	80.20
	S/G顆粒1g (塩野義製薬)	11.70
	ペンタジン注射液15 15mg 1管 (第一三共)	78.00
	カピステン筋注50mg 50mg 1管 (キッセイ薬品工業)	139.00
	レバタン注0.2mg 0.2mg 1管 (大塚製薬)	167.00
	ロピオン静注50mg 50mg 5mL 1管 (科研製薬)	262.00
	ネオビタナイ注射液5mL 5mL 1管(高ビタ(株)製薬)	388.00
	ノイトロピン注射液3.6単位3mL 1管(日本臓器製薬)	179.00
	レバタン坐剤0.2mg 0.2mg 1個 (大塚製薬)	190.90
	<院外薬>	
	後アクタリット錠100「TCK」100mg 1錠(辰巳化学)	54.70
	後アクタリット錠100mg「TOA」100mg 1錠(東亜薬品)	37.00
	後アクタリット錠100mg「サカイ」100mg 1錠(サカイ製薬)	54.70
	後アクタリット錠100mg「タイヨー」100mg 1錠(大洋薬品工業)	44.90
	後アクタリット錠100mg「マイラン」100mg 1錠(マイラン製薬)	52.90

← 院内の採用薬

← 採用品同種同効薬
(採用薬と薬効分類
4桁が同一のもの)

← 同一成分を持つ、
院外薬の一覧



但し、院外薬は、弊社薬品マザーマスタより抽出していますので、作成のタイミングによっては、新規掲載や薬価削除の関連で内容が若干異なります。

同一成分薬の院外薬一覧の作成

他にも、別紙資料が作成できます。

（別紙）薬効分類一覧

薬効分類	分類名	薬効分類	分類名
1	神経系及び感覚器用医薬品	1149	その他の解熱鎮痛消炎剤
1000	神経系及び感覚器用医薬品	115	興奮剤 覚せい剤
11	中枢神経系用薬	1150	興奮剤 覚せい剤
1100	中枢神経系用薬	1151	アンフェタミン系製剤
111	全身麻酔剤	1152	ヨヒンビン製剤
1110	全身		
1111	炭		
1112	ハ		
1113	ハ		
1114	エ		
1115	溶		
	ツ		
1116	亜酸化窒素製剤	1163	プロフェタミン製剤
1119	その他の全身麻酔剤	1164	レボドパミン製剤
112	催眠鎮静剤 抗不安剤	1169	その他の抗パーキンソン
1120	催眠鎮静剤 抗不安剤	117	精神神経用剤
1121	有機プロム化合物製剤	1170	精神神経用剤
1122	メプロバムート系製剤	1171	クロロプロマジン製剤
1123	抱水クロラール系製剤	1172	フェンチアジン系製剤
1124	ベンゾジアゼピン系製剤	1173	モノアミン酸化酵素阻害剤

薬効分類一覧
院内独自分類一覧

（別紙）同一成分異含有量採用薬一覧

一般名(成分名)	商品名・規格単位(会社名)
アセトアミノフェン坐剤	アルピニー坐剤50 50mg 1個 (久光製薬) ネオセデナル坐剤100 100mg 1個 (大正薬品工業)
維持液(4)	ソルデム3AG 500mL1袋 (テルモ) ソリター-T3号G 500mL1瓶 (味の素)
エボエチンα(遺伝子組換え)キ ット	エスポー注射液1500シリンジ 1500国際単位2mL1筒(調製薬酒) エスポー皮下用24000シリンジ 24000国際単位0.5mL1筒(調製薬酒)
塩酸デ	アデカット30mg錠 30mg 1錠 (武田薬品工業) アデカット7.5mg錠 7.5mg 1錠 (武田薬品工業)
塩酸フルスルチアミン注射液	アリナミンF25注 25mg 10mL1管 (武田薬品工業) アリナミンF50注 50mg 20mL1管 (武田薬品工業) アリナミンF5注 5mg 1管 (武田薬品工業)
クラリスロマイシン錠	クラリシッド錠200mg 200mg 1錠 (アポットジャパン) クラリシッド錠50mg小児用 50mg 1錠 (アポットジャパン)

同一成分異含有量採用薬一覧
同一成分後発品一覧

（別紙）採用薬品薬価一覧 【五十音順】

商品名・規格単位/内注外(一般名)	会社名	薬価/改訂日
EP Lカプセル250mg 1カプセル	アルフレッサファーマ	9.70
内用(ポリエンホスファチルコリンカプセル)		2004/04/01
P L顆粒1g	塩野製薬	7.10
内用(非βリニン系感冒剤(4)顆粒)		2004/04/01
アーチスト錠10mg 10mg 1錠	第一製薬	92.40
内用(カ)		2004/04/01
アーチワ		60.50
内用(カ)		2004/04/01
アザル		87.10
内用(サラソスルファピリジン腸溶錠)		2004/04/01
アスコンプ50%1g	日本ケミファ	18.20
内用(アルジオキサ顆粒)		2004/04/01
アダラートCR錠20mg 20mg 1錠	バイエル薬品	46.70

採用薬品薬価一覧

（別紙）妊産婦投与時に注意が必要な採用薬一覧 【五十音順】

商品名 規格単位 (一般名)	妊産婦投与に関する記載
P L顆粒1g (非βリニン系感冒剤(4)顆粒)	1. 妊婦(12週以内あるいは妊娠末期)又は妊娠している可能性のある婦人においては、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。【サリチル酸製剤(アスピリン等)では動物試験(ラット)で催奇形性作用(2)が、また、ヒトで、妊娠末期にアスピリンを投与された患者及びその新生児に出血異常(3)があらわれたとの報告がある。】
アデファイア 外用(フル) アプロリ 内用(アロ) 注射用ア 注射(アル) 注射用ア	2. 妊娠末期のラットにアセトアミノフェンを投与した試験で、弱胎、胎児の動脈管狭窄が報告されている(4)。 3. 授乳中には長期投与を避けること。【本剤中のカフェインは母乳中に容易に移行する。】
注射(注射用) 注射用(口) 外用(デキ) アプロ	1. 妊婦または妊娠している可能性のある婦人においては投与しないこと。【妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。また、ラットにおける妊娠前および妊娠初期投与試験において、臨床用量の約900倍(300mg/kg)で黄体数の減少および骨格異常(13肋骨の短小)の増加が報告されている。】

妊産婦投与時に注意が必要な採用薬一覧
高齢者投与時に注意が必要な採用薬一覧
小児投与時に注意が必要な採用薬一覧


アザル	1. 妊婦：妊婦又は妊娠している可能性のある婦人においては投与しないことが望ましい。【本剤の動物実験では催奇形作用は認められていないが、他のサルファ剤(スルファミドピラジン等)では催奇形作用が認められている。また本剤の代謝物の胎盤通過により、新生児に高ビリルビン血症を起すことがある。】 2. 授乳婦：授乳中の婦人においては投与しないことが望ましいが、やむを得ず投与する場合は授乳を中止する必要がある。【本剤は母乳中に移行する。】
-----	--

配布後に改訂分の冊子作成

改訂分の冊子として、各部門に配布できます。

例えば半年後に...

改訂分の冊子は、
毎月、四半期、半期等、いつでも
作成が可能です。



後発品(ジェネリック医薬品)の管理

クリックすると、
iyakuSerachが立ち上がります。

医薬品情報データベース
iyakuSearch

医薬品名・会社名を入力してください。

文書区分: 医療用 一般用 すべて

医薬品名:

会社名:

検索 リセット

ご利用案内 >> 免責事項 >> バイバーポリシー >> JAPICホームページ >>

アルサズレン顆粒が自動的にテキストボックスに入力されます。

同一成分後発品一覧

同じ成分の薬品は、17件見つかりました。* 後発品は、16件です。

商品名	規格単位名	会社名	単価薬価	廃止日付
アズクレニス顆粒	1g	長生堂製薬	7.30	
アルサズレン顆粒	1g	扶桑薬品工業	7.50	
ウルクゾール顆粒	1g	イセイ	6.90	
ガイザール顆粒	1g	日医工	6.70	
グリクラミド顆粒	1g	協和医療開発	6.40	
グリマック顆粒	1g	メディサ新薬	7.70	
グロリアミン顆粒	1g	サンド	6.50	
セダガストン顆粒	1g	協和医療開発	8.30	
トワズレン顆粒	1g	東和薬品	6.90	
ヒズレンS顆粒	1g	辰巳化学	6.50	
ポドニンS顆粒	1g	大洋薬品工業	7.30	
マーズレン-S顆粒	1g	寿製薬	18.20	
マドカロン顆粒	1g	日本薬品工業	6.70	
マナミンGA顆粒	1g	鶴原製薬	6.40	
メサドリン-S顆粒	1g	前田薬品工業	8.30	
ロウアリン-S顆粒	1g	旭進舎	6.00	

※ 青色は、院内採用薬です。

持参薬から同一成分医薬品の検索

院内採用薬同種同効薬があった場合、表示されます。

ロキソニン錠の同一成分を検索
採用薬と院外薬をみてみましょう！

品名	規格単位	会社名	単位賞価	Jコード	廃止日付
ロキソニン錠	1錠	第一三共	23.30	1149019F1021	
ロキソニン錠	60mg×1錠	マイナ製薬	10.40	1149019F1404	
ロキソニン錠	60mg×1錠	日本薬品工業	6.90	1149019F1064	20090331
ロキソニン錠	60mg×1錠	日本薬品工業	6.90	1149019F1455	
ロキソニン錠	60mg×1錠	東和薬品	6.90	1149019F1390	
ロキソニン錠	60mg×1錠	メヂアック新薬	7.40	1149019F1412	
ロキソニン錠	60mg×1錠	小林薬学工業	6.10	1149019F1110	
ロキソニン錠	60mg×1錠	小林化工	6.10	1149019F1129	20090331
ロキソニン錠	60mg×1錠	小林化工	6.10	1149019F1463	
ロキソニン錠	60mg×1錠	三重薬品	9.50	1149019F1137	20090831
ロキソニン錠	60mg×1錠	三重薬品	9.50	1149019F1510	
ロキソニン錠	60mg×1錠	あすか製薬	11.20	1149019F1153	20090831
ロキソニン錠	60mg×1錠	あすか製薬	11.20	1149019F1528	
ロキソニン錠	60mg×1錠	朝厚製薬	6.10	1149019F1101	20090331
ロキソニン錠	60mg×1錠	朝厚製薬	6.10	1149019F1471	
ロキソニン錠	60mg×1錠	サンド	9.00	1149019F1170	
ロキソニン錠	60mg×1錠	藤達堂	9.50	1149019F1048	20090831
ロキソニン錠	60mg×1錠	藤達堂	9.50	1149019F1506	
ロキソニン錠	60mg×1錠	三和化学研究所	7.40	1149019F1200	
ロキソニン錠	60mg×1錠	日新製薬	6.40	1149019F1218	

採用薬をクリックすると、添付文書情報が表示されます。PDF直リンク

院外薬をクリックするとイヤクサーチ直リンクPDFの閲覧ができます。

iyakuSearch 医薬品情報データベース(無料)

http://database.iapic.or.jp/nw/index

現在流通している、すべての医薬品(持参薬)から同一成分薬の検索が可能になりました。また、院内採用薬の同種同効薬も表示されます。

持参薬から同一成分医薬品の検索

同一細分院内外薬一覧
(同種同効薬(類似薬)
表示付)

医薬品集 別紙資料作成 ウィザード

医薬品集の別紙資料としてご利用いただけます。
さらにWordで直接アレンジして下さい。

院内採用薬と同一成分を持つ院外薬の一覧を作成します。

作成する資料を選択して下さい

- 同一成分異含有量(異規格)採用薬一覧
- 同一成分院外薬一覧

院内採用薬

- 先発品のみ
- 全て
- 後発品のみ

院外薬

- 先発品のみ
- 全て
- 後発品のみ

並び順を選択して下さい

- 内注外-五十音
- 五十音
- 一般名

採用品同種同効薬情報を付加する

※本ソフトには、後発品以外の医薬品を通常上、先発品と検索します。

任意項目を1~3つまで選択して下さい

- 内注外
- 内注外区分
- JPNコード
- YJコード
- 厚生省コード
- 薬効分類
- 院内独自分類
- 商品名

- タイトルデータをカットする
- 後発品は、商品名の前に後を表示する

次へ

キャンセル

別紙資料作成

(別紙) 同一成分院外薬一覧 【五十音順】

一般名	院内採用薬 採用品同種同効薬(類似薬)	院外薬	単価
アクトリット錠	モーバー錠100mg100mg1錠 (田辺三菱製薬)	モーバー錠100mg100mg1錠 (田辺三菱製薬)	85.70
	<1149 その他の解熱鎮痛消炎剤> 採用品同種同効薬(類似薬)		
	ロキソニン錠60mg1錠 (第一三共)	ロキソニン錠60mg1錠 (第一三共)	22.30
	ミナルフェン錠200mg200mg1錠 (ユーシービージャパン)	ミナルフェン錠200mg200mg1錠 (ユーシービージャパン)	17.80
	ミナルフェン錠200mg200mg1錠 (ユーシービージャパン)	ミナルフェン錠200mg200mg1錠 (ユーシービージャパン)	17.80
	ノイロトロン錠4単位4単位1錠 (日本薬研製薬)	ノイロトロン錠4単位4単位1錠 (日本薬研製薬)	36.20
	ソレトロン錠80mg1錠 (日本ケミファ)	ソレトロン錠80mg1錠 (日本ケミファ)	23.80
	フルカムカプセル2.7mg2.7mg1カプセル(ファイザー)	フルカムカプセル2.7mg2.7mg1カプセル(ファイザー)	77.20
	フルカムカプセル2.7mg2.7mg1カプセル(ファイザー)	フルカムカプセル2.7mg2.7mg1カプセル(ファイザー)	77.20
	ジソベイン錠7575mg1錠 (田辺三菱製薬)	ジソベイン錠7575mg1錠 (田辺三菱製薬)	27.70
	ベルタゾン錠2525mg1錠 (あすか製薬)	ベルタゾン錠2525mg1錠 (あすか製薬)	43.10
	モービック錠10mg10mg1錠 (日本ベリンガーインゲルハイム)	モービック錠10mg10mg1錠 (日本ベリンガーインゲルハイム)	75.30
	ロルカム錠4mg4mg1錠 (大正製薬)	ロルカム錠4mg4mg1錠 (大正製薬)	25.80
	セレコクス錠100mg100mg1錠 (アステラス製薬)	セレコクス錠100mg100mg1錠 (アステラス製薬)	80.20
	S.G.顆粒1g (塩野義製薬)	S.G.顆粒1g (塩野義製薬)	11.70
	ペンタジン注射液1515mg1管 (第一三共)	ペンタジン注射液1515mg1管 (第一三共)	78.00
	カピステン筋注50mg50mg1管 (キッセイ薬品工業)	カピステン筋注50mg50mg1管 (キッセイ薬品工業)	139.00
	レバタン注0.2mg0.2mg1管 (大塚製薬)	レバタン注0.2mg0.2mg1管 (大塚製薬)	187.00
	ロビオン静注50mg50mg5mL1管 (料研製薬)	ロビオン静注50mg50mg5mL1管 (料研製薬)	282.00
	ネオピタカイン注シリンジ6mL6mL1個(ピタカイン製薬)	ネオピタカイン注シリンジ6mL6mL1個(ピタカイン製薬)	388.00
	ノイロトロン注射液0.6単位3mL1管(日本薬研製薬)	ノイロトロン注射液0.6単位3mL1管(日本薬研製薬)	179.00
	レバタン坐剤0.2mg0.2mg1個 (大塚製薬)	レバタン坐剤0.2mg0.2mg1個 (大塚製薬)	190.80
	<院外薬>		
	後アクトリット錠100「TCK」100mg1錠(辰巳化学)	後アクトリット錠100「TCK」100mg1錠(辰巳化学)	54.70
	後アクトリット錠100mg「TOAJ」100mg1錠(東亜薬品)	後アクトリット錠100mg「TOAJ」100mg1錠(東亜薬品)	37.00
	後アクトリット錠100mg「サワイ」100mg1錠(メディサ新薬)	後アクトリット錠100mg「サワイ」100mg1錠(メディサ新薬)	54.70
	後アクトリット錠100mg「タイヨー」100mg1錠(大洋薬品工業)	後アクトリット錠100mg「タイヨー」100mg1錠(大洋薬品工業)	44.80
	後アクトリット錠100mg「マイラン」100mg1錠(マイラン製薬)	後アクトリット錠100mg「マイラン」100mg1錠(マイラン製薬)	52.80

持参薬検索画面より、採用品同種同効薬の表示を指示すると、同一成分薬に続き、院内採用薬の同種同効薬も表示されます。

ロキソニン錠10%水和物錠剤の同一成分一覧

閉じる JAPIC IyakuSearchで調べる Googleで検索する GSVIに出力する

同一成分の薬品は、9件見つかりました。
後発品は、9件です。
採用品同種同効薬(類似薬)は、21件です。<1149 その他の解熱鎮痛消炎剤>

商品名	規格単位名	会社名	単価	廃止日付
後 ケンタン錠10%	10%1g	メディサ新薬	16.10	
後 ホナペリド錠	10%1g	富士カプセル	12.10	20090331
後 リンダグリーゼ錠10%	10%1g	陽進堂	12.10	
後 ロキソニン錠	10%1g	第一三共	40.20	
後 ロキソプロフェナトリウム錠10%「C」	10%1g	長生堂製薬	13.90	
後 ロキソニン錠	10%1g	長生堂製薬	13.90	20090331
後 ロゼオール錠10%	10%1g	辰巳化学	16.10	
後 ルルフェタミン錠	10%1g	日医工	18.00	20090331
後 ルルフェタミン錠10%	10%1g	日医工	18.00	
類 ロキソニン錠	60mg1錠	第一三共	40.20	
類 ミナルフェン錠200	200mg1錠	ユーシービージャパン	17.80	
類 ミナルフェン錠200	200mg1錠	ユーシービージャパン	40.20	
類 ノイロトロン錠4単位	4単位1錠	日本薬研製薬	40.20	
類 ソレトロン錠80	80mg1錠	日本ケミファ	40.20	

※青色は、院内採用薬です。
※緑色は、選択した薬品です。
※最後はまとめて採用品同種同効薬(類似薬)を表示します。

簡易医薬品集の作成

従来の医薬品集とは別に、商品属性、効能効果、用法用量からなる表形式の簡易医薬品集を作成する事が可能です

- 商品属性(商品名(規格単位)、一般名、会社名、後発品、劇毒等属性、院内区分)
- 効能効果(効能効果、効能効果使用上の注意、効能効果用法用量)
- 用法用量(用法用量、用法用量使用上の注意)

出力サンプル

簡易医薬品集

簡易医薬品集のファイル名をフルパスで指定して下さい。

☞ Documents and Settings\Administrator\JAPIC\My Documents\簡易医薬品集.Doc

とりあえず、My Documentsに簡易医薬品集で保管する

作成する条件を選択して下さい

出力イメージ | 出力形式 | 抽出条件 | 作成レイアウト | フォントの設定 | 注意点

簡易医薬品集 薬効分類順

1 神経系及び感覚器官用医薬品
11 中枢神経系用薬
112 催眠鎮静剤 抗不安剤
1125 フェニトール酸系及びチオバルビツール酸系製剤

商品名(一般名)会社名	効能効果	用法用量
創向薬 外断 ■フェニバルビタル「エビス」 (フェニバルビタル) エビス製薬 【単位薬価： 31.20】	不眠症、不安緊張状態の軽減、てんかんの発作発作 強直間代発作(全般性発作、大発作) 焦点発作(ジャクソン型発作を含む) 自律神経発作、精神運動発作	フェニバルビタルとして、通常成人 1日 30~200mg を1~4回に分けて経口投与する。 不眠症の場合は、フェニバルビタルとして、通常成人 1回 30~200mg を就寝前に経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減する。
1129 その他の催眠鎮静剤 抗不安剤 商品名(一般名)会社名 習地 新 ■アモバン錠 7.5 (ソビクロン錠) サフ・アベンティス 【単位薬価： 28.80】	1.不眠症 2.麻酔前投薬	1.不眠症：通常、成人にはクアゼバムとして1回20mgを就寝前1回経口投与する。 なお、年齢、症状、疾患により適宜増減するが、1日最高量は30mgとする。 2.麻酔前投薬：通常、成人にはクアゼバムとして1回15~30mgを就寝前1回経口投与する。 なお、年齢、症状、疾患により適宜増減すること。 用法・用量に関連する使用上の注意 不眠症には、就寝の前時に服用させること。また、服用して就寝した後、睡眠中に一時的に起臥して仕事等をする可能性があるときは限用させないこと。

効能効果
効能効果使用上の注意
効能効果用法用量

後発品・劇毒・院内区分
商品名・一般名
会社名・単位薬価

用法用量
用法用量使用上の注意

キャンセル 作成

簡易医薬品集 (薬効分類別)

1 神経系及び感覚器官用医薬品
11 中枢神経系用薬
112 催眠鎮静剤 抗不安剤
1124 ベンゾジアゼピン系薬剤

商品名(一般名)会社名	効能効果	用法用量
【後発品】 ■クアゼバム錠20mg「アメル」 20mg 1錠。 (クアゼバム錠) 共和薬品工業。	1.不眠症 2.麻酔前投薬	1.不眠症：通常、成人にはクアゼバムとして1回20mgを就寝前1回経口投与する。 なお、年齢、症状、疾患により適宜増減するが、1日最高量は30mgとする。 2.麻酔前投薬：通常、成人にはクアゼバムとして1回15~30mgを就寝前1回経口投与する。 なお、年齢、症状、疾患により適宜増減すること。 用法・用量に関連する使用上の注意 不眠症には、就寝の前時に服用させること。また、服用して就寝した後、睡眠中に一時的に起臥して仕事等をする可能性があるときは限用させないこと。
【後発品】 ■ノクスタール錠0.25mg 0.25mg 1錠。 (プロチゾラム錠) アルフレッサファーマ。	不眠症、麻酔前投薬	本剤の用量は、年齢、症状、疾患などを考慮して適宜増減するが、一般に成人には次のように投与する。 (1).不眠症：1回プロチゾラムとして0.25mgを就寝前1回経口投与する。 (2).麻酔前投薬：

MEMO

|||JAPIC|||

||| JAPIC |||

一般財団法人 日本医薬情報センター

医薬品に関する最新の、正確な、そして公正な情報をお届けします。

||| JAPIC |||