

JAPIC Pharma Report

海外医薬情報 速報

発信元：一般財団法人日本医薬情報センター
事業部門 医薬文献情報担当
〒150-0002 渋谷区渋谷 2-12-15 長井記念館 5F

No. 1181 2019年5月9日発行

安全性情報

脳卒中発症後9時間までの灌流画像ガイド下血栓溶解療法：多施設共同無作為化プラセボ対照試験

Thrombolysis Guided by Perfusion Imaging up to 9 Hours after Onset of Stroke

H. Ma (Royal Melbourne Hospital, Parkville/Australia), ほか

N. Engl. J. Med. 380 (19) 1795-1803 / (2019. 5. 9)

alteplase 群では、プラセボ群よりも症候性脳出血の症例が多く認められた。

カルシウムチャネル遮断薬 (Amlodipine, Diltiazem など) と肺癌のリスク：集団ベースのネステッドケースコントロール研究

Calcium Channel Blockers and the Risk for Lung Cancer: A Population-Based Nested Case-Control Study

Victoria Rotshild (The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem/Israel), ほか

Ann. Pharmacother. 53 (5) 445-452 / (2019. 5)

肺移植患者における Metoclopramide 静注に関連した Tacrolimus 濃度上昇による毒性 (尿素窒素値上昇)

Toxic Tacrolimus Concentrations Associated With Intravenous Use of Metoclopramide in a Lung Transplant Patient

Alessio Provenzani (Mediterranean Institute for Transplantation and Advanced Specialized Therapies, Palermo/Italy), ほか

Ann. Pharmacother. 53 (5) 548-549 / (2019. 5)

Health Product InfoWatch (April 2019/5pp)

・ **Monthly Recap of Health Product Safety Information** : 2019年3月に医療専門家および消費者に対して行われた勧告や安全性レビューの概要。Darzalex (daratumumab) によるB型肝炎ウイルス再活性化, Opsumit (macitentan) による肝損傷, Tecentriq (atezolizumab) による免疫性筋炎などについて記載。

編集部注：詳細情報は文献複写サービスをご利用になるか、医薬品情報データベースの **iyakuSearch**, **PharmaCross** などをご覧ください。尚、より速く情報をお伝えするため、一部電子ジャーナルを利用して採択を行っております。文献複写サービスは雑誌入手後となりますのでご了承ください。文献複写申込みは JAPIC 附属図書館／文献複写サービスよりお申込みください。

(<http://www.japic.or.jp/service/library/guidance.html>)