

JAPIC Pharma Report

海外医薬情報 速報

発信元：一般財団法人日本医薬情報センター
事業部門 医薬文献情報担当
〒150-0002 渋谷区渋谷 2-12-15 長井記念館 5F

No. 1184 2019年5月30日発行

安全性情報

小児痙攣性てんかん重積状態の二次治療における Levetiracetam と Phenytoin の比較 (EcLiPSE 試験)：多施設共同オープンラベル無作為化試験

Levetiracetam versus phenytoin for second-line treatment of paediatric convulsive status epilepticus (EcLiPSE): a multicentre, open-label, randomised trial

Mark D Lyttle (Bristol Royal Hospital for Children, Bristol/UK), ほか
Lancet (10186) 2125-2134/ (2019. 5. 25)

phenytoin を投与された被験者 1 例は、治験薬に関連した重篤な有害事象(生命を脅かす低血圧、焦点性発作の増加、意識低下)を呈した。

未治療骨髄腫に対する Daratumumab と Lenalidomide および Dexamethasone の併用：無作為化オープンラベル Phase III 試験

Daratumumab plus Lenalidomide and Dexamethasone for Untreated Myeloma

T. Facon (CHRU, Lille/France), ほか
N. Engl. J. Med. 380 (22) 2104-2115/ (2019. 5. 30)

daratumumab 群 (daratumumab/lenalidomide/dexamethasone) では、対照群 (lenalidomide/dexamethasone) より好中球減少症と肺炎が多く認められた。

Fluoroquinolone (Ciprofloxacin など) と腱断裂との関連性の臨床的意義：Corticosteroid の有無による影響の大きさ：コホート研究

Clinical implications of the association between fluoroquinolones and tendon rupture: The magnitude of the effect with and without corticosteroids

Rebecca Persson (Boston Collaborative Drug Surveillance Program, Lexington/USA), ほか

Br. J. Clin. Pharmacol. 85 (5) 949-959/ (2019. 5)

一般用医薬品 Noscipine と Acenocoumarol および Phenprocoumon との相互作用：8 症例の報告

Interaction of OTC drug noscipine and acenocoumarol and phenprocoumon

Bianca Lokhorst (Netherlands Pharmacovigilance Centre Lareb, 's-Hertogenbosch / Netherlands), ほか

Br. J. Clin. Pharmacol. 85 (5) 1041–1043 / (2019. 5)

相互作用により出血などが認められた。

編集部注：詳細情報は文献複写サービスをご利用になるか、医薬品情報データベースの iyakuSearch, PharmaCross などをご覧ください。尚、より速く情報をお伝えするため、一部電子ジャーナルを利用して採択を行っております。文献複写サービスは雑誌入手後となりますのでご了承ください。文献複写申込みは JAPIC 附属図書館 / 文献複写サービスよりお申込みください。

(<http://www.japic.or.jp/service/library/guidance.html>)