

JAPIC Pharma Report

海外医薬情報 速報

発信元：一般財団法人日本医薬情報センター
事業部門 医薬文献情報担当
〒150-0002 渋谷区渋谷 2-12-15 長井記念館 5F

No. 1197 2019年8月29日発行

安全性情報

HIV 治療のための Dolutegravir と 2 つの異なる Tenofovir プロドラッグの併用：Phase III 研究者主導非盲検無作為化試験

Dolutegravir plus Two Different Prodrugs of Tenofovir to Treat HIV

W.D.F. Venter (University of the Witwatersrand, Johannesburg/South Africa), ほか
N. Engl. J. Med. 381 (9) 803-815 / (2019. 8. 29)

dolutegravir を含むレジメンでは、特に tenofovir alafenamide fumarate との併用で、標準治療レジメンよりも顕著な体重増加がみられた。

ボツワナにおける神経管欠損および抗レトロウイルス治療レジメン：出産転帰調査

Neural-Tube Defects and Antiretroviral Treatment Regimens in Botswana

Rebecca Zash (Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston/USA), ほか
N. Engl. J. Med. 381 (9) 827-840 / (2019. 8. 29)

妊娠時の dolutegravir 曝露に関連する神経管欠損の有病率は、他の抗レトロウイルス治療曝露の場合と比べてわずかに高かった。

受胎時の Dolutegravir 使用-ボツワナからの追加調査データ

Dolutegravir Use at Conception — Additional Surveillance Data from Botswana

Mmakgomo M. Raesima (Botswana Ministry of Health and Wellness, Gaborone/Botswana), ほか

N. Engl. J. Med. 381 (9) 885-887 / (2019. 8. 29)

母親が HIV 陽性で妊娠時に dolutegravir を服用していた分娩における神経管欠損の有病率が、母親が HIV 陰性である分娩よりわずかに高いことが示唆された。

これまで認識されていなかった薬物相互作用：Darunavir - Cobicistat により増強された Ranolazine の副作用（悪心，嘔吐，消化不良など）

Unrecognized Drug Interaction: Ranolazine Adverse Effects Intensified by Darunavir-Cobicistat
John A. Dougherty (Palm Beach Atlantic University, West Palm Beach/USA) , ほか
Ann. Pharmacother. 53 (9) 966-967 / (2019. 9)

編集部注：詳細情報は文献複写サービスをご利用になるか、医薬品情報データベースの iyakuSearch, PharmaCross などをご覧ください。尚、より速く情報をお伝えするため、一部電子ジャーナルを利用して採択を行っております。文献複写サービスは雑誌入手後となりますのでご了承ください。文献複写申込みは JAPIC 附属図書館／文献複写サービスよりお申込みください。

(<http://www.japic.or.jp/service/library/guidance.html>)