

JAPIC Pharma Report

海外医薬情報 速報

発信元：一般財団法人日本医薬情報センター
事業部門 医薬文献情報担当
〒150-0002 渋谷区渋谷 2-12-15 長井記念館 5F

No. 1201 2019年9月26日発行

安全性情報

サイトメガロウイルス再活性化の先制治療のための Maribavir : Phase II 非盲検 Maribavir 用量盲検試験 Maribavir for Preemptive Treatment of Cytomegalovirus Reactivation

Johan Maertens (University Hospitals Leuven, Leuven/Belgium) , ほか

N. Engl. J. Med. 381 (12) 1136-1147 / (2019. 9. 19)

maribavir 群では, valganciclovir 群よりも消化器系有害事象 (特に味覚不全) の発現率が高かった。

後天性メトヘモグロビン血症 : 大量の局所 Benzocaine を使用した 1 症例の報告

Acquired Methemoglobinemia

Otis U. Warren (Miriam Hospital, Providence/USA) , ほか

N. Engl. J. Med. 381 (12) 1158 / (2019. 9. 19)

Case 30-2019 : 肺癌および胸痛を呈した 65 歳の女性 : 1 症例 (高齢者) の報告

Case 30-2019: A 65-Year-Old Woman with Lung Cancer and Chest Pain

Timothy E. Guiney (Massachusetts General Hospital, Boston/USA) , ほか

N. Engl. J. Med. 381 (13) 1268-1277 / (2019. 9. 26)

患者の胸痛は, 免疫チェックポイント阻害剤 (nivolumab) の使用に関連した心筋炎を原因とする症状である可能性が高かった。

腎移植後患者においてカルシニューリン阻害薬 (Tacrolimus など) および性別が Mycophenolic Acid の薬物動態と副作用 (消化管副作用) に及ぼす影響 : 147 例を対象とした研究

Influence of Calcineurin Inhibitor and Sex on Mycophenolic Acid Pharmacokinetics and Adverse Effects Post-Renal Transplant

Calvin J. Meaney (University at Buffalo, Buffalo/USA) , ほか

J. Clin. Pharmacol. 59 (10) 1351-1365 / (2018. 10)