

JAPIC Pharma Report

海外医薬情報 速報

No. 1211 2019年12月5日発行

発信元：一般財団法人日本医薬情報センター
事業部門 医薬文献情報担当
〒150-0002 渋谷区渋谷 2-12-15 長井記念館 5F

安全 性 情 報

Rifabutin 誘発性白血球減少症後の Rifampin 投与の成功：1 症例の報告

Successful Rifampin Administration After Rifabutin-Induced Leukopenia

Rachel S. Britt (Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston/USA), ほか
Ann. Pharmacother. 54 (1) 82–83/ (2020. 1)

肺動脈高血圧に対する Cobicistat でブーストした抗レトロウイルスレジメンと Sildenafil の併用：1 症例の報告

Sildenafil Use for Pulmonary Artery Hypertension With a Cobicistat-Boosted Antiretroviral Regimen

Patricia Pecora Fulco (Virginia Commonwealth University Health System, Richmond/USA), ほか
Ann. Pharmacother. 54 (1) 84–85/ (2020. 1)
sildenafil と cobicistat との相互作用によると考えられる低血圧が認められた。

Health Product InfoWatch (October 2019/6pp)

- **Monthly Recap of Health Product Safety Information :** 2019 年 10 月に医療専門家および消費者に対して行われた勧告や安全性レビューの概要。Lemtrada (alemtuzumab) による自己免疫性肝炎、血球貪食性リンパ組織球症、および重篤な心血管反応などについて記載。
- **Vaccine Safety Biannual Summary : 2019 年 1 月 1 日～2019 年 6 月 30 日の報告**；同期間中、Canada Vigilance Program はワクチンが引き起こした疑いがある免疫後有害事象の報告を 594 件受領した。報告（重篤および非重篤）数が最も多かったのは herpes zoster vaccines (52%) であり、次いで pneumococcal vaccines (22%) および influenza vaccines (9%) であった。herpes zoster vaccines の報告の大部分は Shingrix であった。転帰が死亡の報告は 7 件認められた (tetanus, diphtheria [Td] vaccines : 2 件, diphtheria, tetanus, acellular pertussis [DTaP] vaccine : 1 件, human papillomavirus [HPV] vaccine : 1 件, influenza vaccine : 1 件, measles, mumps, rubella, varicella [MMRV] vaccine : 1 件, pneumococcal vaccine : 1 件)。報告頻度が極めて高かった有害事象（重篤および非重篤）は、予防接種の効果不良、発熱、帯状疱疹、頭痛、疼痛などであった。同期間中に新たな安全性シグナル（潜在的な安全性の問題）は特定されなかったことなどについて記載。