

JAPIC Pharma Report

海外医薬情報 速報

発信元：一般財団法人日本医薬情報センター
事業部門 医薬文献情報担当
〒150-0002 渋谷区渋谷 2-12-15 長井記念館 5F

No. 1215 2020年1月9日発行

安全性情報

原因が明瞭でないとき：1 症例の報告

When the Cause Is Not Crystal Clear

James Forryan (Royal Liverpool and Broadgreen University Hospitals NHS Trust, Liverpool/UK), ほか

N. Engl. J. Med. 382 (1) 74-78 / (2020. 1. 2)

慢性腎疾患患者において、orlistat が二次性高シュウ酸尿症から末期腎不全に至った原因として特定された。

静脈血栓塞栓症の外来患者における抗精神病薬 (Haloperidol など) の使用率の評価：後ろ向きの単施設試験

Assessing the Rate of Antipsychotic Use in Ambulatory Care Patients With a Venous Thromboembolism

Christine Rarrick (Medical University of South Carolina (MUSC), Charleston/USA), ほか

Ann. Pharmacother. 54 (2) 97-104 / (2020. 2)

再投与により急速に発症した重度の Ceftriaxone 誘発性血小板減少症：1 症例の報告

Severe Ceftriaxone-Induced Thrombocytopenia With Rapid Onset on Rechallenge

Jacob Marler (Veteran's Medical Affairs Center, Memphis/USA), ほか

Ann. Pharmacother. 54 (2) 187-188 / (2020. 2)

Methylphenidate, Venlafaxine および Pitolisant で治療されたナルコレプシー患者における脾臓梗塞：1 症例の報告

Splenic Infarction in a Narcoleptic Patient Treated With Methylphenidate, Venlafaxine, and Pitolisant

Charlotte Fouque (Centre Hospitalier Universitaire, Toulouse/France), ほか

Ann. Pharmacother. 54 (2) 189-190 / (2020. 2)

編集部注：詳細情報は文献複写サービスをご利用になるか、医薬品情報データベースの iyakuSearch, PharmaCross などをご覧ください。尚、より速く情報をお伝えするため、一部電子ジャーナルを利用して採択を行っております。文献複写サービスは雑誌入手後となりますのでご了承ください。文献複写申込みは JAPIC 附属図書館／文献複写サービスよりお申込みください。
(<http://www.japic.or.jp/service/library/guidance.html>)