

# JAPIC Pharma Report

## 海外医薬情報 速報

発信元：一般財団法人日本医薬情報センター  
事業部門 医薬文献情報担当  
〒150-0002 渋谷区渋谷 2-12-15 長井記念館 5F

No. 1223 2020年3月5日発行

安全性情報

### 高度薬剤耐性肺結核の治療：オープンラベル単群試験

Treatment of Highly Drug-Resistant Pulmonary Tuberculosis

Francesca Conradie (University of Witwatersrand, Johannesburg/South Africa), ほか  
N. Engl. J. Med. 382 (10) 893-902 / (2020. 3. 5)  
linezolid 治療に関連した末梢神経障害, 免疫抑制が多く認められた。

### Health Product InfoWatch (February 2020/3pp)

#### New Health Product Safety Information

#### Product Monograph Updates ;

・ **Mekinist (trametinib) および Tafinlar (dabrafenib mesylate)** : Mekinist および Tafinlar のカナダ製品モノグラフ (CPM) の警告および使用上の注意, および消費者向け情報のセクションに重度皮膚有害反応 (SCARs) のリスクが追加された。生命を脅かす, または致死的な可能性のあるスティーヴンス・ジョンソン症候群 (SJS) や好酸球増加と全身症状を伴う薬物反応 (DRESS) を含む SCARs の複数の症例が, Mekinist と Tafinlar の併用療法で報告されていることなどについて記載。

・ **Tapazole (methimazole)** : Tapazole の CPM の禁忌, 警告および使用上の注意, 市販後の副作用および消費者向け情報のセクションに急性膵炎のリスクが追加された。現在, Tapazole は methimazole 投与後の急性膵炎の既往歴を有する患者には禁忌である。methimazole 投与患者における急性膵炎の市販後報告が複数存在することなどについて記載。

編集部注：詳細情報は文献複写サービスをご利用になるか, 医薬品情報データベースの iyakuSearch, PharmaCross などをご覧ください。尚, より速く情報をお伝えするため, 一部電子ジャーナルを利用して採択を行っております。文献複写サービスは雑誌入手後となりますのでご了承ください。文献複写申込みは JAPIC 附属図書館/文献複写サービスよりお申込みください。  
(<http://www.japic.or.jp/service/library/guidance.html>)