

JAPIC Pharma Report

海外医薬情報 速報

発信元：一般財団法人日本医薬情報センター
事業部門 医薬文献情報担当
〒150-0002 渋谷区渋谷 2-12-15 長井記念館 5F

No. 1415 2024年1月11日発行

虚血性脳卒中後 72 時間以内の抗血小板薬二剤併用療法 (Clopidogrel, Aspirin) : 二重盲検無作為化プラセボ対照試験

Dual Antiplatelet Treatment up to 72 Hours after Ischemic Stroke

Y. Gao (Capital Medical University, Beijing/China) , ほか

N. Engl. J. Med. 389 (26) 2413–2424 / (2023. 12. 28)

clopidogrel-aspirin 併用治療では、中等度～重度出血のリスクが aspirin 単剤治療より高かった。

小児の炎症性腸疾患における薬剤関連の副作用：観察的レトロスペクティブ研究

Drug-Related Adverse Reactions in Pediatric Inflammatory Bowel Disease

Ana Losa (Centro Hospitalar Universitário de Santo António (CMINCHUdSA) , Porto/Portugal) , ほか

J. Clin. Pharmacol. 64 (1) 103–110 / (2024. 1)

azathioprine による肝炎, mesalamine による胆汁うっ滞性肝炎などが観察された。

P-糖タンパク質阻害剤である SSRI (Fluvoxamine, Paroxetine など) と抗精神病薬 (Olanzapine, Quetiapine など) の併用における P-糖タンパク質を介した相互作用は QT 延長のリスク因子である：医薬品副作用データベース (JADER database) の分析

P-Glycoprotein-Mediated Interaction Is a Risk Factor for QT Prolongation in Concomitant Use of Antipsychotics and SSRIs as P-Glycoprotein-Mediated Inhibitors: Analysis of the Japanese Adverse Drug Event Report Database

Hiroki Morishita (Takasaki University of Health and Welfare, Takasaki/Japan) , ほか

J. Clin. Pharmacol. 64 (1) 118–124 / (2024. 1)

再発性／治療抵抗性の転移性トリプルネガティブ乳癌患者におけるセカンドライン治療としての Sacituzumab Govitecan (Trodelvy) : システマティックレビューとメタアナリシス
Sacituzumab Govitecan as a Second-Line Treatment in Relapsed/Refractory Metastatic Triple-Negative Breast Cancer Patients: A Systematic Review and Meta-analysis

Meghavi Kathpalia (Amity University Uttar Pradesh [AUUP], Noida/India), ほか
Ann. Pharmacother. 58 (1) 44–53 / (2024. 1)

本剤への曝露に関連した副作用は、好中球減少症、疲労、貧血などであった。

編集部注：詳細情報は文献複写サービスをご利用になるか、医薬品情報データベースの iyakuSearch, PharmaCross などをご覧ください。尚、より速く情報をお伝えするため、一部電子ジャーナルを利用して採択を行っております。文献複写サービスは雑誌入手後となりますのでご了承ください。文献複写申込みは JAPIC 附属図書館／文献複写サービスよりお申込みください。
(<http://www.japic.or.jp/service/library/guidance.html>)