

# JAPIC Pharma Report

## 海外医薬情報 速報

発信元：一般財団法人日本医薬情報センター  
事業部門 医薬文献情報担当  
〒150-0002 渋谷区渋谷 2-12-15 長井記念館 5F

No. 1448 2024年9月5日発行

### 経口抗生物質と重篤な皮膚有害反応のリスク：コホート内症例対象研究

Oral Antibiotics and Risk of Serious Cutaneous Adverse Drug Reactions

Erika Y. Lee (University of Toronto, Toronto/Canada), ほか

JAMA. 332 (9) 730-737 / (2024. 9. 3)

sulfonamides, cephalosporins, nitrofurantoinなどは、macrolidesと比較し、重篤な皮膚有害反応のリスク増加と関連していた。

### NOS1AP 遺伝子の rs10494366 コモンバリエーションは Digoxin 使用者の心突然死リスクを変えない：集団ベースのコホート研究

The NOS1AP gene rs10494366 common genetic variant does not modify the risk of sudden cardiac death in users of digoxin

Negin Soroush (University Medical Center, Rotterdam/The Netherlands), ほか

Br. J. Clin. Pharmacol. 90 (9) 2159-2165 / (2024. 9)

現在の digoxin 使用が心突然死リスクの増加と関連している。

### ブルトン型チロシンキナーゼ阻害薬 (Ibrutinib, Acalabrutinib など) の心血管系事象 (心不全、肺水腫など)：米国食品医薬品局有害事象報告システムデータベースに基づくリアルワールド研究

Cardiovascular events of Bruton's tyrosine kinase inhibitors: A real-world study based on the United States Food and Drug Administration Adverse Event Reporting System database

Zeng-Xiang Zhao (Nanjing Medical University, Nanjing/China), ほか

Br. J. Clin. Pharmacol. 90 (9) 2166-2179 / (2024. 9)

### Health Product InfoWatch (August 2024/7pp)

(Health Canada, Canada)

#### New Health Product Safety Information

##### Safety briefs

・妊娠中の Calcium carbonate 制酸薬とミルク・アルカリ症候群：2024年2月14日時点で、Health Canada は、calcium carbonate 制酸薬への曝露に関連する妊娠中のミルク・アルカリ症候群 (MAS) について、カナダにおける副作用報告を2件受領しており、文献報告を8件 (カナダの1件を含む) 特定している。全症例で、妊婦の MAS は、calcium carbonate 制酸

薬製品の大量摂取と関連していたことなどについて記載。

### Product monograph updates

- ・ Clavulin ( amoxicillin / clavulanate potassium[clavulanic acid] ) およびその他の amoxicillin 含有製品：カナダ製品モノグラフの警告と使用上の注意，副作用，患者医薬品情報の section が，薬剤性腸炎症候群のリスクについて更新された，または更新される予定であることなどについて記載。
- ・ Retevmo (selpercatinib)：カナダ製品モノグラフの警告と使用上の注意，副作用，患者医薬品情報の section が，大腿骨頭すべり症 (SCFE/SUFE) のリスクについて更新されたことなどについて記載。
- ・ Sodium-glucose cotransporter-2 (SGLT2) inhibitors : Invokana (canagliflozin) , Invokamet (canagliflozin / metformin) , Forxiga (dapagliflozin) , Xigduo (dapagliflozin / metformin) , Jardiance (empagliflozin) , Synjardy (empagliflozin / metformin) ; SGLT2 inhibitor の中止や糖尿病性ケトアシドーシス (DKA) の標準治療を行っているにもかかわらず DKA が長期化するリスク，2型糖尿病 (T2DM) 患者の大手術前にいつ SGLT2 inhibitor を中止すべきかに関する勧告について，SGLT2 inhibitor のカナダ製品モノグラフの用法・用量と警告および使用上の注意の section が更新された，または更新される予定であることなどについて記載。

編集部注：詳細情報は文献複写サービスをご利用になるか，医薬品情報データベースの iyakuSearch などをご覧ください。尚，より速く情報をお伝えするため，一部電子ジャーナルを利用して採択を行っております。文献複写サービスは雑誌入手後となりますのでご了承ください。文献複写申込みは JAPIC 附属図書館／文献複写サービスよりお申込みください。( <https://www.japic.or.jp/service/library/guidance.html> )