

JAPIC Pharma Report

海外医薬情報 速報

発信元：一般財団法人日本医薬情報センター
事業部門 医薬文献情報担当
〒150-0002 渋谷区渋谷 2-12-15 長井記念館 5F

No. 1461 2024年12月5日発行

現行の閉経期 Hormone 療法と心血管疾患のリスク：スウェーデンの全国規模のレジストリに基づく emulated target trial（無作為化試験を模倣した観察研究）

Contemporary menopausal hormone therapy and risk of cardiovascular disease: Swedish nationwide register based emulated target trial

Therese Johansson (Uppsala University, Uppsala/Sweden), ほか

BMJ (8450) e 078784/ (2024. 11. 30)

oestrogen-progestin と心疾患や静脈血栓塞栓症のリスク増加との関連, tibolone と虚血性心疾患, 脳梗塞, 心筋梗塞リスク増加との関連などがみられた。

多発性そう痒性皮疹および色素過剰：1 症例の報告

Multiple pruritic eruptions and hyperpigmentation

Yu-Ying Huang (Chinese Academy of Medical Science and Peking Union Medical College, Nanjing/China), ほか

BMJ (8450) e 079262/ (2024. 11. 30)

hydroxyurea による皮膚障害がみられた。

非小細胞肺癌患者における Osimertinib の曝露-反応モデリング

Exposure-response modelling of osimertinib in patients with non-small cell lung cancer

Martin Johnson (AstraZeneca, Cambridge/UK), ほか

Br. J. Clin. Pharmacol. 90 (12) 3263-3276/ (2024. 12)

osimertinib の曝露増加は, 有害事象（発疹, 下痢）を増加させる可能性がある。

Health Product InfoWatch（November 2024/6pp）（Health Canada, Canada）

New Health Product Safety Information

Product monograph updates

・Brilinta (ticagrelor) および Crestor (rosuvastatin calcium) : カナダ製品モノグラフの薬物相互作用および患者情報の section が, この 2 剤が関与する薬物間相互作用の結果として生じるミオパチー（横紋筋融解症を含む）のリスクに関する情報により改訂されたことなどについて記載。

編集部注：詳細情報は文献複写サービスをご利用になるか, 医薬品情報データベースの iyakuSearch などをご覧ください。尚, より速く情報をお伝えするため, 一部電子ジャーナルを利用して採択を行っております。文献複写サービスは雑誌入手後となりますのでご了承ください。文献複写申込みは JAPIC 附属図書館/文献複写サービスよりお申込みください。 (<https://www.japic.or.jp/service/library/guidance.html>)