

JAPIC Pharma Report

海外医薬情報 **速報**

発信元：一般財団法人日本医薬情報センター
事業部門 医薬文献情報担当
〒150-0002 渋谷区渋谷 2-12-15 長井記念館 5F

No. 1466 2025年1月16日発行

再発性または難治性多発性骨髄腫に対する Talquetamab+Teclistamab: 多施設共同非無作為化オープンラベル Phase Ib~II 試験

Talquetamab plus Teclistamab in Relapsed or Refractory Multiple Myeloma

Y.C. Cohen (Tel Aviv Sourasky Medical Center, Tel Aviv/Israel) , ほか

N. Engl. J. Med. 392 (2) 138-149/ (2025. 1. 9)

talquetamab+teclistamab の投与では、それぞれの単独投与よりもグレード3または4の感染症発症率が高かった。

中等度～重度の慢性腎臓病患者におけるナトリウム・グルコース共輸送体2阻害剤 (Canagliflozin, Dapagliflozin など) と有害事象 (血液量減少症) の関連: 無作為化比較試験のシステマティックレビューとメタアナリシス

Association between sodium-glucose cotransporter-2 inhibitor and adverse events in patients with moderate to severe chronic kidney disease: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials

Satoru Mitsuboshi (Kaetsu Hospital, Niigata-shi/Japan) , ほか

Eur. J. Clin. Pharmacol. 81 (2) 217-225/ (2025. 2)

肺癌治療として Nivolumab 単独投与または Ipilimumab との併用投与はどちらがより有効か? : メタアナリシス

Is nivolumab alone or in combination with ipilimumab more effective for treating lung cancer? : a meta-analysis

Qasi Najah (Elmergib University, Al-Khums/Libya) , ほか

Eur. J. Clin. Pharmacol. 81 (2) 269-278/ (2025. 2)

nivolumab と ipilimumab の併用投与は、無増悪生存を有意に改善したが、グレード3-4の有害事象や治療関連死のリスク増大に関連していた。

高齢者における Isosorbide Mononitrate 誘発性末梢性浮腫：用量依存性のリスクと薬物相互作用の症例研究

Peripheral edema induced by isosorbide mononitrate in an elderly patient: A case study of dose-related risks and drug interactions

Akansha A. Pandit (Uka Tarsadia University Bardoli, Gujarat/India) , ほか

Eur. J. Clin. Pharmacol.81 (2) 333–336／ (2025. 2)

編集部注：詳細情報は文献複写サービスをご利用になるか、医薬品情報データベースの iyakuSearch などをご覧ください。尚、より速く情報をお伝えするため、一部電子ジャーナルを利用して採択を行っております。文献複写サービスは雑誌入手後となりますのでご了承ください。文献複写申込みは JAPIC 附属図書館／文献複写サービスよりお申込みください。
(<https://www.japic.or.jp/service/library/guidance.html>)