JAPIC Pharma Report 海外医薬情報 **達夫**

発信元:一般財団法人日本医薬情報センター 事業部門 医薬文献情報担当 〒150-0002 渋谷区渋谷 2-12-15 長井記念館 5F

No. 1478 2025年4月10日発行

経口抗凝固薬を投与されている HIV および心房細動を有する高齢患者における出血リスクの比較: 実薬対照コホート研究

Comparative Bleeding Risk in Older Patients With HIV and Atrial Fibrillation Receiving Oral Anticoagulants

Claire M. Quinlan(Harvard Medical School,Boston/USA),ほか JAMA Internal Medicine 185(4)431-439/(2025. 4) warfarin および rivaroxaban は,apixaban と比較して大出血率が高かった。

経鼻胃管挿入後の Benzocaine によるメトヘモグロビン血症: 1 症例(高齢者)の報告

Benzocaine-Induced Methemoglobinemia After Nasogastric Tube Insertion

Robert T. Williams (Weill Cornell Medicine, New York/USA) , $l \pm \hbar^3$ JAMA Internal Medicine 185 (4) 457-458/ (2025. 4)

体重減少を呈する患者における降圧薬の服用:1症例の報告

Antihypertensive Medications in Patients With Weight Loss

Farrin A. Manian (Mercy Hospital-St Louis, St Louis/USA)

JAMA Internal Medicine 185 (4) 475-476/ (2025. 4)

患者は重度低血圧となり失神した。降圧薬(hydrochlorothiazide, lisinopril)中止後に正常血圧となった。

編集部注:詳細情報は文献複写サービスをご利用になるか、医薬品情報データベースの iyakuSearch などをご覧ください。尚、より速く情報をお伝えするため、一部電子ジャーナルを利用して採択を行っております。文献複写サービスは雑誌入手後となりますのでご了承ください。文献複写申込みは JAPIC 附属図書館/文献複写サービスよりお申込みください。

(https://www.japic.or.jp/service/library/guidance.html)