

# JAPIC Pharma Report

## 海外医薬情報 速報

発信元：一般財団法人日本医薬情報センター  
事業部門 医薬文献情報担当  
〒150-0002 渋谷区渋谷 2-12-15 長井記念館 5F

No. 1537 2026年6月18日発行

### 妊娠前後の鎮痛剤使用と構造的先天性欠損の重症度：National Birth Defects Prevention Study (NBDPS) のデータの解析

Periconceptional Use of Analgesics and Severity of Structural Birth Defects

Sebastian O. Ekenze (Boston University School of Public Health, Boston/USA), ほか  
Clin. Pharmacol. Ther. 120 (1) 114–121 / (2026. 7)

acetaminophen と, aspirin+caffeine, hydrocodone, codeine, または propoxyphene との併用, および hydrocodone 単独で, 生存率の低い先天性欠損のリスク上昇が認められた。

### マクロライド系抗生物質 (Erythromycin, Clarithromycin) と Fentanyl, Hydromorphone, または Oxycodone との併用による Opioid 毒性：集団ベース研究

Opioid Toxicity Following Concomitant Use of Macrolide Antibiotics with Fentanyl, Hydromorphone, or Oxycodone: A Population-Based Study

Tony Antoniou (University of Toronto, Toronto/Canada), ほか  
Clin. Pharmacol. Ther. 120 (1) 122–138 / (2026. 7)

### BRAF 阻害剤 (Vemurafenib など) および MEK 阻害剤 (Cobimetinib など) に関連する皮膚副作用：WHO のファーマコビジランスデータのリアルワールド解析

Cutaneous Adverse Drug Reactions Associated With BRAF and MEK Inhibitors: A Real-World Analysis of WHO Pharmacovigilance Data

Natalia Sauer (Wroclaw Medical University, Wroclaw/Poland), ほか  
Clin. Pharmacol. Ther. 120 (1) 274–285 / (2026. 7)

### 65 歳以上のメディケア受給者における組換え帯状疱疹ワクチン接種後のギラン・バレー症候群

Guillain-Barré Syndrome Following Recombinant Zoster Vaccine in US Medicare Adults Age 65 Years or Older

Susan dos Reis (University of Maryland, Baltimore/USA), ほか  
Drug Safety 49 (7) 859–867 / (2026. 7)

編集部注：詳細情報は文献複写サービスをご利用になるか、医薬品情報データベースの iyakuSearch などをご覧ください。尚、より速く情報をお伝えするため、一部電子ジャーナルを利用して採択を行っております。文献複写サービスは雑誌入手後となりますのでご了承ください。文献複写申込みは JAPIC 附属図書館/文献複写サービスよりお申込みください。(https://www.japic.or.jp/service/library/guidance.html)