JAPIC Pharma Report
海外医薬情報 速報

No. １５３９　２０２６年7月２日発行

発信元：一般財団法人日本医薬情報センター
事業部門　医薬文献情報担当
〒150-0002 渋谷区渋谷 2-12-15 長井記念館 5F

慢性 B 型肝炎に対する Bepirovirsen 治療の Phase III 試験結果：2 件の二重盲検試験

Phase 3 Results of Bepirovirsen Treatment for Chronic Hepatitis B Virus Infection

Jinlin Hou（Southern Medical University，Guangzhou／China），ほか

N. Engl. J. Med. 394（24）2395－2406／（2026．6．25）

グレード 3 以上の有害事象（アラニンアミノトランスフェラーゼ増加など）が，bepirovirsen 群の 16%，プラセボ群の 3%で報告された。

自己免疫疾患患者における Hydroxychloroquine の長期投与が COVID-19 の転帰に及ぼす影響の検討：システマティックレビューとメタアナリシス

Exploring the long-term hydroxychloroquine's effects on COVID-19 outcomes in patients with autoimmune diseases: a systematic review and meta-analysis

Heba M. Amal（Cairo University，Cairo／Egypt），ほか

Eur. J. Clin. Pharmacol.（82）140／（2026．6）

2 つの試験で，hydroxychloroquine 治療群では未治療群より急性腎障害の発生率が高かった。

Rosuvastatin と Atorvastatin の補正 QT 間隔に対する短期的な作用の比較：標的試験を模倣したレトロスペクティブコホート研究

Short-term effect of rosuvastatin versus atorvastatin on the corrected QT interval: a target trial emulation

Xin Chen（Shanghai Jiao Tong University School of Medicine，Shanghai／China），ほか

Eur. J. Clin. Pharmacol.（82）148／（2026．6）

rosuvastatin は atorvastatin よりも，短期的な補正 QT 間隔の延長と関連した。

慢性心不全に対するループ利尿薬（Torsemide，Piretanide など）の比較：システマティックレビューとメタアナリシス

Comparison of loop diuretics for chronic heart failure: a systematic review and meta-analysis

Sami Taleghani（Copenhagen University Hospital，Copenhagen／Denmark），ほか

Eur. J. Clin. Pharmacol.（82）150／（2026．6）

torsemide と piretanide の統合解析では，furosemide と比較して重篤な有害事象のリスクが高かった。

GLP-1 作動薬（Semaglutide，Tirzepatide，Retatrutide など）に関連した異常感覚：データマイニング解析と文献レビュー

Dysesthesia associated with GLP-1 agonist therapies: data-mining analysis and literature review

Marie-Laure Laroche（Limoges' University Hospital，Limoges／France），ほか

Eur. J. Clin. Pharmacol.（82）154／（2026．6）

急性虚血性脳卒中の患者における Tenecteplase 静注の長期の時間枠での安全性と有効性：アップデートメタアナリシス

Safety and efficacy of intravenous tenecteplase in patients with acute ischemic stroke in the extended time window: an updated meta-analysis

Mokhtar Rejili（Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University，Riyadh／Saudi Arabia），ほか

Eur. J. Clin. Pharmacol.（82）158／（2026．6）

長期の時間枠では tenecteplase 0.25 mg/kg は症候性頭蓋内出血を含む頭蓋内出血を増加させた。

ファーマコビジランスデータベースにおける間質性肺疾患の解析：コーディングの課題と解釈のバイアス—最新情報

Analysis of interstitial lung disease in pharmacovigilance databases: Coding challenges and interpretation biases—An update

Romane Freppel（Université Bourgogne Europe，Dijon／France），ほか

Br. J. Clin. Pharmacol. 92（7）2147－2161／（2026．7）

最も頻繁に関与が指摘されている既知の肺毒性を有する医薬品は amiodarone，methotrexate，nivolumab，pembrolizumab，everolimus であった。

Ocrelizumab 誘発の大腸炎：VigiBase の不均衡分析，2 例の症例報告および文献レビュー

Ocrelizumab-induced colitis: VigiBase disproportionality analysis, case reports and literature review

Audrey Fresse（University Hospital of Nancy，Vandoeuvre-lès-Nancy／France），ほか

Br. J. Clin. Pharmacol. 92（7）2162－2170／（2026．7）

重症患者における Linezolid 誘発性乳酸アシドーシス：発現率，重症度，予測因子に関する多施設共同研究

Linezolid-induced lactic acidosis in critically ill patients: A multicentre study of incidence, severity and predictors

Lina Naseralallah（Hamad Medical Corporation，Doha／Qatar），ほか

Br. J. Clin. Pharmacol. 92（7）2239－2249／（2026．7）

編集部注：詳細情報は文献複写サービスをご利用になるか，医薬品情報データベースの iyakuSearch などをご覧ください。尚，より速く情報をお伝えするため，一部電子ジャーナルを利用して採択を行っております。文献複写サービスは雑誌入手後となりますのでご了承ください。文献複写申込みは JAPIC 附属図書館／文献複写サービスよりお申込みください。（https://www.japic.or.jp/service/library/guidance.html）