

JAPIC Pharma Report

海外医薬情報 速報

発信元：一般財団法人日本医薬情報センター
事業部門 医薬文献情報担当
〒150-0002 渋谷区渋谷 2-12-15 長井記念館 5F

No. 1546 2026年8月20日発行

再発・治療抵抗性骨髄腫に対する Talquetamab–Daratumumab：多施設共同非盲検 Phase III 試験

Talquetamab–Daratumumab in Relapsed or Refractory Myeloma

Roberto Mina (University of Turin, Turin/Italy), ほか

N. Engl. J. Med. 395 (7) 671–683 / (2026. 8. 13)

Tal-DP (talquetamab + daratumumab + pomalidomide) 群, Tal-D (talquetamab + daratumumab) 群, DPd (daratumumab + pomalidomide + dexamethasone) 群のそれぞれ 63.0%, 52.6%, 53.7% で重篤な有害事象 (肺炎など) が生じ, 致死の有害事象は 1.8%, 4.0%, 4.6% に認められた。

関節リウマチにおける生物学的／標的合成疾患修飾性抗リウマチ薬 (b/tsDMARD) に関連した感染リスク：システマティックレビューとネットワークメタアナリシス

Infection risks associated with b/tsDMARDs in rheumatoid arthritis: a systematic review and network meta-analysis

Xue-Mei Zhang (Jiangwan Hospital of Hongkou District, Shanghai/China), ほか

Eur. J. Clin. Pharmacol. 82 (8) 200 / (2026. 8)

従来の抗リウマチ薬 (methotrexate など) と adalimumab などとの併用で, 重篤感染リスク上昇との関連が認められた。

中国南部の漢民族における, 抗甲状腺薬 (Methimazole, Propylthiouracil など) による無顆粒球症のための薬理ゲノミクススクリーニング戦略と指標スクリーニング効率

Pharmacogenomic screening strategy and indicative screening efficiency for antithyroid drug-induced agranulocytosis in the Southern Han Chinese

Li Ma (Fujian Medical University Union Hospital, Fujian/China), ほか

Eur. J. Clin. Pharmacol. 82 (8) 203 / (2026. 8)

セロトニン症候群の誘因と臨床的特徴：既公表の症例報告と症例集積の患者レベルの分析によるシステマティックレビュー

Precipitants and clinical features of serotonin syndrome: a systematic review with patient-level analysis of published case reports and series

Bohdan Blyzniuk (Clinic for Psychiatry and Psychotherapy, Windisch/Switzerland), ほか

Eur. J. Clin. Pharmacol. 82 (8) 210 / (2026. 8)

セロトニン症候群と最も関連性の高い抗うつ薬として trazodone が, 最も関連性の高い非抗うつ

つ薬として fentanyl および tramadol が特定された。

Aspirin 服用患者における上部・下部消化管出血予防のための PPI (Omeprazole, Esomeprazole など) : システマティックレビューとメタアナリシス

Proton pump inhibitors for prevention of upper and lower gastrointestinal bleeding in patients taking aspirin: a systematic review and meta-analysis

Siqi Jia (General Hospital of Northern Theater Command, Shenyang/China) , ほか

Eur. J. Clin. Pharmacol. 82 (8) 212/ (2026. 8)

aspirin 使用者において PPI と下部消化管出血との関連が非無作為化試験から示唆された。

新世代抗ヒスタミン薬 (Emedastine など) 使用者における眠気の発生率 : システマティックレビューとネットワークメタアナリシス

The incidence of sleepiness in newer-generation antihistamine users: a systematic review and network meta-analysis

Nattawut Leelakanok (Burapha University, Chonburi/Thailand) , ほか

Eur. J. Clin. Pharmacol. 82 (8) 215/ (2026. 8)

エチオピアで 48 時間以内に検出された COVID-19 ワクチン (Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine) による有害事象 (注射部位反応, 頭痛, 発熱など) : 資源が限られた状況における, コホート事象モニタリングの効率への影響 : プロスペクティブ能動的監視研究

Most COVID-19 vaccine adverse events detected within 48 hours in Ethiopia: implications for cohort event monitoring efficiency in resource-limited settings

Tigist Dires Gebreyesus (Ethiopian Food and Drug Authority, Ababa/Ethiopia) , ほか

Eur. J. Clin. Pharmacol. 82 (8) 216/ (2026. 8)

急性白血病における Venetoclax 濃度と発熱性好中球減少症との関連 : レトロスペクティブ分析

Association between venetoclax concentration and febrile neutropenia in acute leukemia: a retrospective analysis

Yuting Yan (The First Affiliated Hospital with Nanjing Medical University, Nanjing/China) , ほか

Eur. J. Clin. Pharmacol. 82 (8) 224/ (2026. 8)

SARS-CoV-2 ワクチン (Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria) 接種後の静脈血栓塞栓症のリスク : ゲノムワイド関連研究および集団ベースの観察研究からのエビデンス

Risk of venous thromboembolism after SARS-CoV-2 vaccination—Evidence from genome-wide association study and population-based observational study

Sofia Attelind (Uppsala University, Uppsala/Sweden) , ほか

Br. J. Clin. Pharmacol.

<https://doi.org/10.1002/bcp.70614>

電子カルテの処方パターンを用いた、小児における抗生物質（Ceftriaxone, Flucloxacillin など）アレルギーの特定：レトロスペクティブ研究

Identification of antibiotic allergies in children using prescribing patterns in the electronic medical record

Georgia Koutsaplis (The Royal Children's Hospital Melbourne, Victoria/Australia) , ほか
Br. J. Clin. Pharmacol.

<https://doi.org/10.1002/bcp.70618>

Tofacitinib 投与中の関節リウマチ患者における脂質プロファイルの推移：前向き CENTRA コホート研究からのエビデンス

Trajectory of lipid profiles in rheumatoid arthritis patients receiving tofacitinib: Evidence from the prospective CENTRA cohort

Hong Huang (Peking University First Hospital, Beijing/China.) , ほか
Br. J. Clin. Pharmacol.

<https://doi.org/10.1002/bcp.70598>

tofacitinib 曝露は脂質プロファイルの著しい上昇と関連していた。

小児がん患者における Cisplatin 誘発性急性腎障害のメタボロミクス解析：多施設共同前向き研究

Metabolomic investigation of cisplatin-induced acute kidney injury in paediatric cancer patients

Yong Jin Lim (University of British Columbia, Vancouver/Canada) , ほか
Br. J. Clin. Pharmacol.

<https://doi.org/10.1002/bcp.70587>

フランスのヘルスケアデータベースに基づく主要な先天性奇形の同定（Valproic acid との関連）：epi-meres 全国母子登録を用いた概念実証研究

Identification of major congenital malformations based on healthcare databases in France: A proof-of-concept study using the epi-meres nationwide mother-child register

Tom Duchemin (EPI-PHARE Scientific Interest Group in Epidemiology of Health Products, Saint-Denis/France) , ほか
Br. J. Clin. Pharmacol.

<https://doi.org/10.1002/bcp.70582>

編集部注：詳細情報は文献複写サービスをご利用になるか、医薬品情報データベースの iyakuSearch などをご覧ください。尚、より速く情報をお伝えするため、一部電子ジャーナルを利用して採択を行っております。文献複写サービスは雑誌入手後となりますのでご了承ください。文献複写申込みは JAPIC 附属図書館／文献複写サービスよりお申込みください。（<https://www.japic.or.jp/service/library/guidance.html>）