

JAPIC Pharma Report

海外医薬情報 速報

発信元：一般財団法人日本医薬情報センター
事業部門 医薬文献情報担当
〒150-0002 渋谷区渋谷 2-12-15 長井記念館 5F

No. 1551 2026年10月1日発行

重度熱傷における高用量 Vitamin C の静注と死亡および臓器機能不全：VICTORY 無作為化臨床試験 High-Dose Intravenous Vitamin C and Mortality and Organ Dysfunction in Severe Burn Injury : The VICTORY Randomized Clinical Trial

Christian Stoppe (University Hospital Würzburg, Würzburg/Germany) , ほか
JAMA 336 (11) 929-938/ (2026. 9. 15)
vitamin C 群ではプラセボ群と比較して、28 日死亡率および入院死亡率が高かった。

切除可能な胃腺癌および食道胃接合部腺癌に対する、周術期 Durvalumab+FLOT (Fluorouracil, Leucovorin, Oxaliplatin, Docetaxel) : 国際無作為化二重盲検プラセボ対照多施設共同 Phase III 試験 (MATTERHORN) における、病理学的応答別の全生存期間および無イベント生存期間に関する最終結果 Perioperative durvalumab plus fluorouracil, leucovorin, oxaliplatin, and docetaxel for resectable gastric and gastroesophageal junction adenocarcinoma (MATTERHORN): final results of overall survival and event-free survival by pathological response in a global, randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre, phase 3 trial

Yelena Y Janjigian (Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York/USA) , ほか
Lancet (10560) 1114-1128/ (2026. 9. 19)
治療に関連する可能性のある死亡に至った有害事象は、durvalumab 群で 475 例中 6 例 (1%) , プラセボ群で 469 例中 2 例 (1%未満) に生じた。

ナルコレプシー1 型に対する Oveporexton : 2 件の無作為化プラセボ対照 Phase III 試験の結果 Oveporexton for Narcolepsy Type 1 — Results from Two Phase 3 Trials

Y. Dauvilliers (Gui-de-Chauliac Hospital, Montpellier/France) , ほか
N. Engl. J. Med. 395 (12) 1166-1179/ (2026. 9. 24)
副作用として頻尿増加と一過性不眠症が多く認められた。

Ceftriaxone 誘発性肝障害 : 発生率, 表現型特性, および予測因子 : レトロスペクティブコホート研究 Ceftriaxone-induced liver injury: Incidence, phenotypic characterization and predictive factors

Mohamed Hatem (Hamad Medical Corporation, Doha/Qatar) , ほか
Br. J. Clin. Pharmacol.
<https://doi.org/10.1002/bcp.70657>

アテローム動脈硬化性心血管疾患に対する PCSK9 阻害薬（Alirocumab または Evolocumab）の使用における心血管および神経精神的転帰：レトロスペクティブコホート研究

Cardiovascular and neuropsychiatric outcomes with PCSK9 inhibitors in atherosclerotic cardiovascular disease: A retrospective cohort study

Tianshu Gu (Liverpool John Moores University and Liverpool Heart and Chest Hospital, Liverpool/UK) , ほか

Br. J. Clin. Pharmacol.

<https://doi.org/10.1002/bcp.70687>

PCSK9 阻害薬の使用は、うつ病および不安の高い発現率と関連していた。

高齢入院患者における抗コリン薬（Metoclopramide など）および中枢神経作用薬（Morphine など）の負荷と入院中の有害転帰（転倒や骨折、譫妄など）との関連：レトロスペクティブ横断解析

Anticholinergic and central nervous system-active drug burdens and their associations with adverse in-hospital outcomes among older inpatients

Kittipak Jenghua (University of Phayao, Phayao/Thailand) , ほか

Br. J. Clin. Pharmacol.

<https://doi.org/10.1002/bcp.70682>

Italian Phytovigilance System における医療用大麻への関連が疑われる副作用（幻覚、精神錯乱など）についての自発報告分析

Analysis of spontaneous reports of suspected adverse reactions related to medical cannabis from the Italian Phytovigilance System

Ilaria Ippoliti (National Institute of Health, Rome/Italy) , ほか

Br. J. Clin. Pharmacol.

<https://doi.org/10.1002/bcp.70695>

腎移植レシピエントにおける貧血に対する Roxadustat の有効性と Tacrolimus との薬物相互作用：レトロスペクティブコホート研究

Efficacy of roxadustat for anaemia in kidney transplant recipients and its drug-drug interaction with tacrolimus: A retrospective cohort study

Haoran Qin (The Third Affiliated Hospital of Soochow University, Changzhou/China) , ほか

Br. J. Clin. Pharmacol.

<https://doi.org/10.1002/bcp.70713>

roxadustat 投与群では、tacrolimus のトラフ濃度が有意に上昇し、トラフ濃度／投与量比が著しく高くなった。

HLA-B*15:02 陰性患者において、HLA-B*15:21 キャリアであることは、Carbamazepine 誘発性非即時型皮膚副作用（斑状丘疹状皮疹など）の感受性因子である：レトロスペクティブコホート研究

HLA-B*15:21 carrier status is a susceptibility factor of carbamazepine-induced nonimmediate cutaneous adverse reactions in HLA-B*15:02-negative patients: A retrospective cohort study

Warit Ruanglertboon (Prince of Songkla University, Songkhla/Thailand) , ほか

Br. J. Clin. Pharmacol.

<https://doi.org/10.1002/bcp.70714>

Piperacillin-Tazobactam による骨髄抑制の重症度と各因子との相関：多変量順序ロジスティック回帰モデルによる解析

Correlation between severity of myelosuppression caused by piperacillin-tazobactam and factors: Analysis through a multivariate ordered logistic regression mode

Meng-Ting Li (Southern University of Science and Technology, Foshan/China) , ほか

Br. J. Clin. Pharmacol.

<https://doi.org/10.1002/bcp.70720>

高い抗コリン負荷は、股関節部骨折後の中期的および長期的死亡率の増加と関連：システマティックレビューとメタアナリシス

Higher anticholinergic burden is associated with increased medium- and long-term mortality following hip fracture: A systematic review and meta-analysis

Alejandro Valcuende-Rosique (Hospital Padre Jofre, Valencia/Spain) , ほか

Br. J. Clin. Pharmacol.

<https://doi.org/10.1002/bcp.70780>

DPYD の c.2766+3A>T 変異は、エクソン 12 スキッピングを引き起こし、DPD 欠損および重度 Fluoropyrimidine 毒性と関連する：1 症例の報告

The variant c.2766+3A>T in DPYD leads to exon 21 skipping and is associated with DPD deficiency and severe fluoropyrimidine toxicity

Sara Salvador-Martín (Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón (IiSGM), Madrid/Spain) , ほか

Br. J. Clin. Pharmacol.

<https://doi.org/10.1002/bcp.70782>

結腸直腸癌患者は XELOX (oxaliplatin, capecitabine) の投与を受けていた。

編集部注：詳細情報は文献複写サービスをご利用になるか、医薬品情報データベースの iyakuSearch などをご覧ください。尚、より速く情報をお伝えするため、一部電子ジャーナルを利用して採択を行っております。文献複写サービスは雑誌入手後となりますのでご了承ください。文献複写申込みは JAPIC 附属図書館／文献複写サービスよりお申込みください。(https://www.japic.or.jp/service/library/guidance.html)