

JAPIC Pharma Report

海外医薬情報 速報

発信元：一般財団法人日本医薬情報センター
事業部門 医薬文献情報担当
〒150-0002 渋谷区渋谷 2-12-15 長井記念館 5F

No. 1552 2026年10月8日発行

エコーの難聴：1症例の報告

An Echo Unheard

Roni Eichel (Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem/Israel) , ほか

N. Engl. J. Med. 395 (13) 1319-1325/ (2026. 10. 1)

rituximabなどが投与され、免疫抑制下にあった本症例の感音難聴は、ウイルス性蝸牛損傷によるものであった。

高リスク早期非小細胞肺癌における Atezolizumab 導入療法および地固め療法＋体幹部定位放射線療法と体幹部定位放射線療法単独との比較：多施設共同オープンラベル優越性無作為化比較 Phase III 試験 (SWOG/NRG S1914)

Induction and consolidation atezolizumab with stereotactic body radiation therapy versus radiation alone in high-risk, early-stage non-small-cell lung cancer (SWOG/NRG S1914): a multicentre, open-label, superiority, phase 3, randomised controlled trial

Megan E Daly (University of California Irvine Chao Family Comprehensive Cancer Center, Orange/USA) , ほか

Lancet (10562) 1313-1325/ (2026. 10. 3)

atezolizumab＋体幹部定位放射線療法群では全生存期間の改善は認められず、グレード3以上の有害事象（死亡を含む）がより多く報告された。無益性に関する最初の中間解析で患者登録が終了した。

輸血（血小板および血漿）関連 α -gal 症候群の疫学的研究：国際的多施設共同レトロスペクティブコホート研究

Epidemiologic Study of Transfusion-Related Alpha-Gal Syndrome

Richard M. Kaufman (Dartmouth Hitchcock Medical Center, Lebanon/USA) , ほか

JAMA Internal Medicine 186 (10) 1202-1211/ (2026. 10)

心臓磁気共鳴イメージングで診断されなかった, Lenalidomide に関連した心筋損傷 : 1 症例の報告

Lenalidomide-Associated Myocardial Injury Despite Nondiagnostic Cardiac Magnetic Resonance Imaging

Michael Pamonag (MedStar Georgetown University Hospital, Washington/USA) , ほか
Ann. Pharmacother.

<https://doi.org/10.1177/10600280261490111>

集中治療室における Heparin に関連すると疑われた遊離 Valproic Acid 濃度の増加 (338%増加) : 1 症例の報告

Probable Increase of Free Valproic Acid Concentrations Associated With Heparin in the Intensive Care Unit: A Case Report

Emily K. Alsbury (The University of Montana, Missoula/USA) , ほか
Ann. Pharmacother.

<https://doi.org/10.1177/10600280261489827>

早期 Dexmedetomidine 追加が Propofol による鎮静下の人工換気患者の予後に及ぼす影響 : 標的試験エミュレーション研究

Effect of Early Dexmedetomidine Addition on Prognosis in Mechanically Ventilated Patients Under Propofol Sedation: A Target Trial Emulation Study

Bozhi Zhang (The First People's Hospital of Foshan/China) , ほか
Ann. Pharmacother.

<https://doi.org/10.1177/10600280261478937>

dexmedetomidine の早期開始は徐脈および重度低血圧のリスクを増加させた。

高血圧における Baxdrostat の有効性および安全性 : GRADE 評価を用いたシステマティックレビューおよび無作為化対照試験のメタアナリシス

Efficacy and Safety of Baxdrostat in Hypertension: A GRADE-Assessed Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials

Muhammad Burhan (Dow University of Health Sciences, Karachi/Pakistan) , ほか
Ann. Pharmacother.

<https://doi.org/10.1177/10600280261480672>

baxdrostat は高カリウム血症やその他の電解質障害のリスクを増加させた。

小児での Clonidine の投薬過誤：フランスにおける多施設共同研究からの知見

Paediatric clonidine medication errors: Findings from a multicentre French study

Eve-Marie Thillard (University Hospital of Tours, Tours/France) , ほか

Br. J. Clin. Pharmacol.

<https://doi.org/10.1002/bcp.70797>

薬剤関連性の中樞神経系血管炎および可逆性脳血管収縮症候群：WHO ファーマコビジランスデータベース (Vigibase) の世界的な不均衡分析

Drug-associated central nervous system vasculitis and reversible cerebral vasoconstriction syndrome: A global disproportionality analysis of the WHO pharmacovigilance database (VigiBase)

Basile Chretien (Nagoya University Graduate School of Medicine, Aichi/Japan) , ほか

Br. J. Clin. Pharmacol.

<https://doi.org/10.1002/bcp.70789>

中樞神経系血管炎は主に免疫チェックポイント阻害剤 (pembrolizumab, nivolumab) と抗甲状腺薬 (propylthiouracil) に関連し、可逆性脳血管収縮症候群は主にセロトニン作動薬 (triptans, SSRIs) と血管作用薬 (麦角誘導体など) に関連した。

抗 HER2 療法 (Trastuzumab など) に伴う、心エコー検査で認められる心機能障害および重度の転帰：不均衡分析と報告レベルのクラスター分析の比較

Anti-HER2 therapy-associated echocardiography-related cardiac dysfunction and severe outcomes: Comparison of disproportionality and report-level cluster analyses

Junjie Liu (Guangzhou Medical University, Guangzhou/China) , ほか

Br. J. Clin. Pharmacol.

<https://doi.org/10.1002/bcp.70810>

イングランドのプライマリケアにおける Benzodiazepine 系薬剤 (Oxazepam など) の使用：集団レベルの観察研究における処方パターンと有害転帰 (死亡など)

Benzodiazepines use in primary care England: Prescribing patterns and adverse consequences

Alvina Chaudhry (University of Huddersfield, Huddersfield/UK) , ほか

Br. J. Clin. Pharmacol.

<https://doi.org/10.1002/bcp.70824>

健康被験者における Aildenafil と Clarithromycin, Cimetidine または Rifampin との薬物動態学的および安全性上の相互作用：非盲検固定順序試験

Pharmacokinetic and safety interactions between aildenafil and clarithromycin, cimetidine, or rifampin in healthy subjects

Ran Xie (Peking University First Hospital, Beijing/China) , ほか

Br. J. Clin. Pharmacol.

<https://doi.org/10.1002/bcp.70781>

CYP3A4 阻害薬 clarithromycin を aildenafil と併用した場合に、aildenafil の $AUC_{0-\infty}$ は 2.58 倍, C_{max} は 1.67 倍に増加した。投与量調節は、臨床反応および忍容性を考慮して行うべきである。

編集部注：詳細情報は文献複写サービスをご利用になるか、医薬品情報データベースの iyakuSearch などをご覧ください。尚、より速く情報をお伝えするため、一部電子ジャーナルを利用して採択を行っております。文献複写サービスは雑誌入手後となりますのでご了承ください。文献複写申込みは JAPIC 附属図書館／文献複写サービスよりお申込みください。
(<https://www.japic.or.jp/service/library/guidance.html>)